

	<p>Observatie neonaat na TCA gebruik van de moeder</p>
Documentgebied	Verloskunde, kraamzorg, JGZ, neonatologie
Groep(en)	Alle leden aangesloten bij de geboorteorganisatie Nijmegen en omstreken “samen zorgen voor nieuw leven”
Autorisatie	Programmaraad
Beoordelaar(s)	R. Verlaak, T. Antonius
Documentbeheerder(s)	VSV Samen werkgroep protocollen
Auteur	C. Simons
Datum publicatie	01-11-2022
Openbaar document	ja
Controledatum	01-11-2023
Versie document	1.0

Doel :

Duidelijkheid verschaffen voor de aanstaande moeder met TCA gebruik.

Definitie

Tricyclische antidepressiva (TCA) voorbeelden hiervan zijn: amitriptyline (Tryptizol[®]), clomipramine (Anafranil[®]), nortriptyline (Nortrilen[®]) en imipramine (Tofranil[®]).

Indicatie/toepassing

- ernstige depressie
- neuropatische pijn
- profylaxe van chronische spanningshoofdpijn
- profylaxe van migraine (met name voor deze reden zien we soms het gebruik bij zwangeren)

Contra-indicaties

Alle bovengenoemde middelen passeren de placenta.

Met amitriptyline is ruime ervaring in de zwangerschap en wijst niet op toegenomen kans op aangeboren afwijkingen.

Voor de moeder:

- overgevoeligheid voor tricyclische antidepressiva
- recent myocardinfarct, hartblokkade, hartritmestoornis, coronair insufficiëntie
- cave interactie's met andere medicijnen

Werkwijze

Middelen alleen op strikte indicatie gebruiken.

TCA's: in verband met veranderende farmacokinetiek in de zwangerschap is het aan te raden om regelmatig plasmaspiegels te bepalen. In het 2^e en 3^e trimester kunnen de plasmaspiegels dalen en is dosisverhoging misschien noodzakelijk. Bij chronisch gebruik en na toediening in de laatste weken kunnen neonatale onthoudingsverschijnselen optreden(zoals prikkelbaarheid, hypertonie, tremoren, onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen) en soms anticholinerge verschijnselen (urineretentie, obstipatie)
Lactatie: kan volgens voorschrift worden gebruikt

Observatie/Controles

Alle genoemde middelen geven kans op onthoudingsverschijnselen en/of ademhalingsproblematiek. **Overleg met kinderarts over observatie** van de pasgeborene bij langdurig gebruik van de middelen bij de moeder zodat al voor de geboorte duidelijk is hoe lang de pasgeborene opgenomen zal worden.

Risico

Bij de neonaat: neonatale onttrekkingsverschijnselen, ademhalingsdepressie.