

Zorgpad VSV Samen: foetale PAC's in de zwangerschap
Auteur: M. Peeters, PA klinisch verloskundige
Bron: PND Radboudumc
Beoordelaar: C. Simons, 1 ^e lijns verloskundige
Datum publicatie: 01-09-2022
Controledatum: 01-09-2023

PAC's in de zwangerschap

PAC = premature atriale contractie. De etiologie hiervan is deels onbekend, wordt vaak beschouwd als onrijpheid van de prikkelgeleiding in het foetale hart. Is vaak passagère van aard. Soms is het een uiting van onderliggende cardiale pathologie.

Werkwijze zwangerschap

Wanneer er een foetale ritmestoornis is vastgesteld dan wordt de zwangere verwezen naar de afdeling prenatale diagnostiek (PND) van het Radboudumc voor een uitgebreide screening van het hart (GUO type 2).

Als er bij de GUO geen bijzonderheden worden gezien en het blijkt dat het om Premature Atriale Contracties (PAC's) gaat, dan moet vervolgens de foetale hartfrequentie twee keer in de week worden gecontroleerd op zowel PAC's als een tachycardie. Dit mag in de 1e lijn plaatsvinden maar desgewenst kan dit ook in de 2e lijn plaatsvinden.

Als tijdens vier opeenvolgende controles geen PAC's meer worden gehoord dan hoeven er geen extra controles voor de foetale hartfrequentie worden gepland en kunnen de reguliere verloskundige controles weer worden opgepakt.

Werkwijze neonaat

Indien er blijvend sprake is van PAC's dient de partus in de 2^e lijn plaats te vinden met daarna monitoring van de neonatale hartfrequentie op de afdeling kindergeneeskunde of neonatologie.