

<b>VSV Samen zorgpad: verhoogd risico op hypertensieve aandoeningen en/of IUGR</b>
--

<b>Auteur:</b> M. Peeters, PA klinisch verloskundige Radboudumc
---

<b>Beoordelaar:</b> J. van Drongelen perinatoloog en lid VSV werkgroep basiszorg, Cara Simons 1 <sup>e</sup> lijns verloskundige
--

<b>Bron:</b> NVOG module acetylsalicylzuur 2019
---

<b>Datum publicatie:</b> 01-03-2026
-------------------------------------

<b>Controledatum:</b> 01-03-2027
----------------------------------

### **Verwijzing adviesconsult 2<sup>e</sup> lijn gebruik acetylsalicylzuur in de zwangerschap**

Zwangeren die na de intake in de 1<sup>e</sup> lijn een verhoogd risico hebben op pre-eclampsie, HELLP syndroom en/of foetale groeibeperking (FGR/IUGR), dienen te worden verwezen naar de 2<sup>e</sup> lijn voor counseling van gebruik acetylsalicylzuur 1dd 80 of 160 mg in de zwangerschap van 12 – 36 weken ter preventie hiervan. Dit consult in de 2<sup>e</sup> lijn mag ook telefonisch plaatsvinden.

**Adviseer het gebruik van acetylsalicylzuur aan zwangere vrouwen die in een vorige zwangerschap een kind met een geboortegewicht <p10 hebben gehad voor preventie van IUGR (zie ook het document transmurale zorg bij groeirestrictie in anamnese met flowchart).**

### **Adviseer het gebruik van acetylsalicylzuur aan zwangere vrouwen met ≥ 1 hoge risicofactor op het ontwikkelen van pre-eclampsie:**

- Algemene voorgeschiedenis:

- Chronische nierziekten
- Auto-immuun aandoeningen, zoals APS of SLE, RA en morbus Crohn
- Diabetes mellitus type I of II
- Pre-existente hypertensie (chronische hypertensie)

- Obstetrische voorgeschiedenis: pre-eclampsie in een eerdere zwangerschap

### **Bespreek de mogelijkheid om acetylsalicylzuur te gebruiken bij zwangere vrouwen met ≥ 2 matige risicofactoren voor pre-eclampsie:**

- Algemene voorgeschiedenis:

- Obesitas (BMI ≥ 35 kg/m<sup>2</sup>)
- Pre-eclampsie in de familie (moeder of zuster)

- Obstetrische voorgeschiedenis:

- Bewezen placentaire insufficiëntie in de voorgeschiedenis:
  - eerder kind met laag geboortegewicht (FGR in de anamnese)
  - perinatale sterfte (IUVD in de anamnese)
  - abruptio placentae
- Onverklaarde perinatale sterfte (IUVD)

- Huidige zwangerschap:

- Nullipariteit
- Maternale leeftijd ≥ 40 jaar
- Interval tussen zwangerschappen > 10 jaar
- Meerlingzwangerschap
- Zwangerschap na eiceldonatie

### **Overige indicaties:**

Cardiovasculaire aandoeningen waarvoor al preconceptioneel acetylsalicylzuur voorgeschreven is, zoals:

- young stroke of andere CVA's in de voorgeschiedenis

- cardiale aandoeningen (aangeboren, operatieve correcties, na myocard infarct, etc)
- stent- of dotterprocedure in de voorgeschiedenis

*Discontinueer deze niet tijdens en na de zwangerschap of durante partu!*